

AVALIAÇÃO DO TRANSTORNO DA COMPULSÃO ALIMENTAR PERIÓDICA EM OBESOS SUBMETIDOS À CIRURGIA BARIÁTRICA EM SEU PERÍODO PRÉ- OPERATÓRIO

BASMAGE, João Pedro Teixeira¹ (joao_basmage@hotmail.com); **SOUZA, José Carlos**² (josecarlossouza@uol.com.br); **NETO, Larissa Sawaris** (larissasawarisneto@gmail.com)¹; **GHADIE, Samer Majid**¹ (samerghadie@hotmail.com); **RASI, Lucas** (lucasrasi@uol.com.br)³

¹Discente do curso de Medicina da UEMS – Campo Grande;

²Docente do curso de Medicina da UEMS – Campo Grande;

³Docente da faculdade de tecnologias do SENAI – Campo Grande;

A obesidade é distúrbio multifatorial e complexa que deve ser combatida conforme sua origem, seja ela psíquica, biológica ou social. A procura pela correção invasiva (Cirurgia Bariátrica) aumenta cada vez mais, porém esta pode não ser a solução para um problema de origem comportamental como no caso do Transtorno da Compulsão alimentar periódica (TCAP). Os objetivos do presente estudo são: Avaliar a manifestação e presença do transtorno da compulsão alimentar periódica em obesos candidatos a cirurgia bariátrica. Correlacionar os dados sócios demográficos (idade, gênero, raça, estado civil e presença de obesos na família) dos pacientes candidatos à cirurgia bariátrica com a presença do TCAP; Definir o percentual de pacientes com TCAP no pré-operatório e verificar o grau de compulsão apresentado; Notificar o serviço de psicologia local de pesquisa acerca do número de pacientes com o transtorno apresentando escores elevados. A metodologia é de uma pesquisa quantitativo, analítico, observacional e transversal. Os dados, após coletados, foram tabulados e analisados no programa Epi-info, versão 7.1.1.14. Será utilizado o teste t de Student com intervalo de confiança de 95% e erro de 0.05, além da estatística descritiva. Resultados: Amostra total estudada foi de 59 pacientes, 69.5% do sexo feminino, 67.79% casados e idade média de 35.46 anos. Observou-se transtorno da compulsão alimentar em 30.5% dos pacientes (23.7% moderado e 6.8% grave). O presente trabalho mostra a elevada prevalência do transtorno da compulsão alimentar periódica em indivíduos que procuram a cirurgia bariátrica, destacando-se a fundamental importância no precoce diagnóstico pré operatório.

Palavras-chave: Compulsão alimentar; Transtorno alimentar; Cirurgia bariátrica; Obesidade

Agradecimentos: Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela concessão de bolsa de iniciação científica ao primeiro autor



Realização:

UFGD
Universidade Federal
da Grande Dourados

UEMS
Universidade Estadual
de Mato Grosso do Sul

Parceiros:

CAPES

CNPq
Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico